

<b>Клиническая шкала оценки тяжести венозных заболеваний</b> (Venous Clinical Severity Score, VCSS)				
Количество баллов (по каждому признаку)				
0	1	2	3	
<b>Боль</b>				
Отсутствие	Эпизодическая, не влияет на активность, не требует приема анальгетиков	Ежедневная, умеренно ограничивает активность, эпизодический прием анальгетиков	Ежедневная, существенно ограничивает активность или требует регулярного приема анальгетиков	
<b>Варикозные вены</b>				
Отсутствие	Единичные	Множественные: в пределах бедра <b>или</b> голени	Распространенные: на бедре <b>и</b> голени или одновременное поражение БПВ и МПВ	
<b>Венозный отек</b>				
Отсутствие	Только вечером, не выше лодыжек	Днем, распространен выше лодыжек	Утром, требует изменения активности или возвышенного положения конечностей	
<b>Пигментация кожи</b>				
Отсутствие или точечная, низкоинтенсивная (светло-коричневая, цвет загара)	Диффузная, но в ограниченной области и долго существующая (коричневая)	Диффузная, в пределах дистальной 1/3 голени или недавно появившаяся (фиолетовая)	Распространенная, выше дистальной 1/3 голени, недавно появившаяся	
<b>Воспаление</b>				
Отсутствие	Слабо выраженный целлюлит, ограниченный краевой зоной вокруг язвы	Умеренно выраженный целлюлит, большая часть дистальной 1/3 голени	Сильно выраженный целлюлит дистальной 1/3 голени и выше или тяжелая венозная экзема	
<b>Индурация</b>				
Отсутствует	Локальная, в зоне лодыжек, до 5 см.	Медиальная или латеральная поверхность в пределах дистальной 1/3 голени	Вся дистальная 1/3 голени или больше	
<b>Активная язва (количество)</b>				
0	1	2	>2	
<b>Длительность существования язвы</b>				
Нет	<3 месяцев	>3 месяцев <1 года	>1 года	
<b>Размер язвы</b>				
Нет	<2 см	2 – 6 см	>6 см	
<b>Компрессионная терапия</b>				
Не используется	Нерегулярное применение	Использование большую часть дней	Полный режим компрессии – трикотаж + возвышенное положение конечностей	
<b>Итого</b>				